


Client KENDY		Job Name KAZ Yodofol_ Uhlmann			Press Run 3 + 3	
Dimensions in mm 157 x 200 mm		Die Cut (Non-print colour) *cut	Hot Foil -	Varnish -		
Colour 1 BLACK	Colour 2 Pantone 1935	Colour 3 Pantone 287	Colour 4 -	Colour 5 -	Colour 6 -	
DATE [dd/mm/yy] 06/02/20	TIME 13:22pm	Folding Direction Short Side ↔↔↔	Notes 105398		Client Approval	



ЙОДОФОЛ / YODOFOL

ЙОДОФОЛ

Инструкция по применению

Состав: таблетка содержит **Активные вещества:** калия йодид 200 мкг, что соответствует 150 мкг йода, кислота фолиевая 400 мкг. **Вспомогательные вещества:** лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, кислота кремниевая, глюкоза, тальк, магния стеарат.

Описание
Круглые двояковыпуклые таблетки желтого цвета. Йод способствует нормальному функционированию щитовидной железы, входит в состав ее гормонов (тироксина, трийодтиронина). Предотвращает развитие эндемического зоба, кретинизма. Недостаточность фолиевой кислоты вызывает нарушенный синтез ДНК в клетке, готовящейся к репликации хромосом и делению. Механизм действия обусловлен участием фолиевой кислоты в синтезе нуклеиновых кислот и в делении клеток, а также участием в качестве кофактора в синтезе пуринов и пиримидинов, что делает ее решающим фактором в формировании центральной нервной системы, которая развивается у человека на 15-28 день после оплодотворения. Фолиевая кислота необходима для нормального созревания мегалобластов и образованию нормобластов. Ее недостаток приводит к накоплению в плазме крови гомоцистеина, являющегося маркером атеросклеротических изменений.

Область применения
В качестве дополнительного источника йода и фолиевой кислоты.

Показания
-предупреждение и возмещение дефицита йода и фолиевой кислоты у женщин в период планирования беременности, а также в период беременности и лактации;
-профилактика внутриутробных аномалий развития нервной системы; - профилактика нарушения роста и полового созревания у подростков;
-состояние хронической усталости, нарушение памяти;
-профилактика периферических невропатий;
-профилактика рецидивов после терапевтического лечения йоддефицитного зоба.

Способ применения и дозы
Йодофол принимают внутрь по 1 таблетке в день во время или после еды, запивая достаточным количеством воды. Длительность курса приема продукта определяется врачом.

Взаимодействие
Йодофол не следует принимать в сочетании с анальгетиками, противосудорожными препаратами, антацидами, колестирамином, сульфаниламидами, антибиотиками, цитостатиками, поскольку они уменьшают усвоение фолиевой кислоты. При одновременном применении Йодофола с калийсберегающими диуретиками возможно развитие гиперкалиемии. Одновременное применение Йодофола и препаратов лития способствует развитию зоба и гипотиреоза.

Особые указания
При профилактике заболевания щитовидной железы или при использовании других препаратов йода необходимо проконсультироваться с врачом перед применением продукта.

Форма выпуска и упаковка
Таблетки
30 таблеток в блистере или 150 таблеток в полипропиленовом дозаторе.
1, 2 или 3 блистера или 1 дозатор вместе с инструкцией на государственном и русском языках в картонной коробке.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте!


Срок годности
3 года.

Условия реализации
Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети. Свидетельство о государственной регистрации №КЗ.16.01.97.003.Е.000043.01.16 Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством.

Производитель
«КЕНДИ ЛТД», Болгария (8 Гурмазовское шоссе, 2227 Божуриште).

Владельцем торговой марки и государственной регистрации является компания «УОРЛД МЕДИЦИН ЕВРОПА ЕООД», Болгария

Уполномоченное лицо или организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителя по качеству продукции (товара): ТОО «РИН Фарм», г. Алматы, пр. Суюнбая 222 Б, тел/факс: +7(727)2529090



105398

FRONT



ЙОДОФОЛ / YODOFOL

ЙОДОФОЛ

Қолданылуы жөніндегі нұсқаулық

Құрамы: таблетканың құрамында **Белсенді заттар:** 150 мкг йодқа сәйкес келетін 200 мкг калий йодиді, 400 мкг фолий қышқылы. **Қосымша заттар:** лактоза, микрокристалды целлюлоза, кремний қышқылы, глюкоза, тальк, магний стеараты.

Сипаттамасы
Дөңгелек, екі беті деңес сары түсті таблеткалар. Йод қалқанша бездің қалыпты қызмет етуіне мүмкіндік береді, оның гормондарының (тироксиннің, трийодтирониннің) құрамына кіреді. Эндемиялық жемсаудың, кретинизмнің дамуына жол бермейді. Фолий қышқылының жеткіліксіздігі хромосомның репликациясына және бөлінуге дайындалып жатқан жасушада ДНҚ-ның синтезі бұзады. Өсер ету механизмі нуклеин қышқылының синтезінде және жасушаларың бөлінуінде тетрагидрофолат түріндегі фолий қышқылының қатысуымен, сондай-ақ пуриндер мен пиримидиндердің синтезінде коэнзимдер ретінде қатысуы арқылы жүзеге асады, ол оны ұрықтанғаннан кейін 15-28 күнде адамда дамитын орталық жүйке жүйесінің қалыптасуының шешуші факторы етеді. Фолий қышқылы мегалобласттардың қалыпты пісіп жетілуі және нормобласттардың пайда болуы үшін қажет. Оның жеткіліксіздігі қан плазмасында атеросклеротикалық өзгерулердің маркері болып табылатын гомоцистеиннің жиналып қалуына әкеп соғады.

Қолданылу аумағы
Йод және фолий қышқылының қосымша көзі ретінде тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде ұсынылады.

Қолданылуы
-жүктілікті жоспарлау кезеңінде, сондай-ақ жүктілік және лактация кезеңінде йод пен фолий қышқылы тапшылығының алдын алуға және орнын толтыруға;
-жүйке жүйесінің жатыр ішінде даму ақауларының алдын алуға;
-жасөспірімдерде өсу мен жыныстық пісіп жетілудің бұзылуының алдын алуға;
-созылмалы шаршау жағдайында, жады нашарлағанда;
-шеткергі невропатияларда;
-йодтапшылықты жемсауды терапиялық емдеуден кейін қайталануының алдын алуға.

Қолдану тәсілдері және дозасы
Ішке күніне 1 таблеткадан ас қабылдау кезінде немесе одан кейін, судың мол мөлшерімен ішіп қабылдайды. Өнімді қабылдар кезде дәрігерден кеңес алу керек.

Әрекеттесуі
Йодофолды анальгетиктермен қолдануға болмайды, құрысуға қарсы препараттармен, антацидтермен, колестираминмен, сульфаниламидтермен, антибиотиктермен, цитостатиктермен біріктіріп қолданбаған жөн, өйткені олар фолий қышқылының сіңуін азайтады. Йодофолды калийжинақтаушы диуретиктермен бір мезгілде қолданған кезде гиперкалиемия дамуы мүмкін. Йодофолды және литий препараттарын бір мезгілде қолдану жемсаудың және гипотиреоздың дамуына мүмкіндік береді.

Айрықша нұсқаулар
Қалқанша без ауруларында немесе йодтың басқа препараттарын қолданған кезде өнімді қолданар алдында дәрігерден ақыл-кеңес алу қажет.

Шығарылу түрі және қаптамасы
Таблеткалар
Блистерде 30 таблетка немесе 150 таблетка полипропиленді дозаторда.
1,2 немесе 3 блистерден немесе 1 дозатордан қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.

Сақтау шарттары
Құрғақ, жарық түспейтін жерде, 25°С-ден аспайтын температурада сақтау керек.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі
3 жыл.

Босатылу шарттары
Дәріханалардан, мамандандырылған дүкендерден және сауда желісінен. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №КЗ.16.01.97.003.Е.000043.01.16 Тағамға биологиялық белсенді қоспа. Дәрілік зат болып саналмайды.

Өндіруші
«КЕНДИ ЛТД», Болгария (8 Гурмазовск тас жолы, 2227 Божуриште).

Сауда белгісі мен мемлекеттік тіркеу куәлігінің иесі «УОРЛД МЕДИЦИН ЕВРОПА ЕООД» компаниясы, БОЛГАРИЯ.

ҚР аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасы бойынша шағымдар қабылдайтын ұйымның мекенжайы: «РИН Фарма» ЖШС, Алматы қ-сы, Сүйінбай д-лы, 222Б, тел/факс: +7(727)2529090



105398

BACK